

Después de la colocación permanente de InterStim

Qué esperar después de la cirugía

Clínica: Houston Methodist Urology - Baytown

Teléfono: 832.556.6046

Seguimiento: Usualmente 4-8 semanas después de la cirugía.

Preguntas de programación: Para ayuda con el programador, ajustes o estimulación, el representante de Medtronic es un excelente primer contacto. La clínica está para preocupaciones de la herida, dolor, fiebre, drenaje, problemas para orinar o si algo no se siente bien.

Lo normal	Llame a la clínica / MyChart o al rep. de Medtronic	Vaya a emergencias
<p>Dolor, moretones o hinchazón Puede pasar cerca del bolsillo de la nalga y la incisión de la espalda por varias semanas.</p>	El dolor empeora, la medicina no ayuda, o la incisión esta mas roja, caliente o sensible.	Dolor fuerte que no se controla, hinchazon rapida, o sangrado abundante.
<p>Pequeño manchado o drenaje claro Un poco por 1-2 días puede ser normal. El pegamento se cae solo.</p>	Drenaje turbio, con pus, mal olor, o que aumenta; la incisión se abre.	Fiebre con escalofrios, sentirse muy enfermo, o enrojecimiento que se extiende rápido.
<p>Estimulación suave Puede sentirse como cosquilleo, pulsos, vibración, o puede no sentirse nada.</p>	La estimulación duele, da choques o molesta. Para ayuda con el programador o ajustes, el rep. de Medtronic puede guiarle paso a paso.	Sensación fuerte de choque que no para después de apagar el dispositivo.
<p>Los síntomas pueden variar Los síntomas de vejiga o intestino a veces necesitan ajustes de programación.</p>	Los síntomas empeoran mucho, el dispositivo parece apagado, o no puede usar el programador.	No puede orinar con vejiga dolorosamente llena, dolor fuerte de abdomen, o vómitos repetidos.
<p>Caminar es bueno Actividad ligera diaria está bien.</p>	Preguntas sobre trabajo, ejercicio, viaje o manejar.	Dolor de pecho, falta de aire, desmayo, o hinchazón/dolor en una sola pantorrilla.
<p>Proteja el cable nuevo Evite levantar peso, doblarse profundo, torcerse, estirarse, correr o saltar hasta que le autoricen.</p>	Se cae o se tuerce fuerte y luego aumenta el dolor, cambia la estimulación, o vuelven los síntomas.	Caida con dolor fuerte, debilidad, entumecimiento, o dificultad para caminar.
<p>Ducharse Usualmente después de 24-48 horas si la incisión esta cerrada. No tina, piscina o jacuzzi hasta que le autoricen.</p>	La incisión se moja y luego se pone roja, duele, o empieza a drenar.	Sintomas fuertes de infeccion o sangrado que no mejora con presión.

Después de la colocación permanente de InterStim

Instrucciones generales

Instrucciones generales

Control del dolor: Use el plan de dolor de sus papeles de alta. Muchos pacientes sólo necesitan acetaminophen/Tylenol después de los primeros días. Evite ibuprofen/naproxen si le dijeron que no tome antiinflamatorios.

Cuidado de incisiones: Mantenga las incisiones limpias y secas. No frote el pegamento. No use pomadas, peroxide, alcohol o cremas a menos que se lo indiquen.

Dispositivo / programador: Use el programador como le enseñaron. Si la estimulación molesta, puede bajarla o apagar el dispositivo. El rep. de Medtronic es el mejor primer contacto para ayuda con el programador.

Actividad: Caminar es bueno. Evite levantar peso, doblarse profundo, torcerse, estirarse, correr y saltar hasta que le autoricen. La mayoría protege el cable por 4-6 semanas.

Manejar: No maneje si toma narcóticos para dolor. Maneje solo cuando este alerta, pueda sentarse/girar cómodo y pueda frenar con seguridad.

Procedimientos médicos: Diga a otros doctores que tiene un implante Medtronic InterStim. MRI puede permitirse sólo bajo reglas específicas del dispositivo. No diatermia/tratamiento de calor profundo.

Llame primero si es posible: Para preguntas de herida, dolor, fiebre, drenaje, problemas para orinar o dudas medicas, llame al 832.556.6046 o envíe MyChart. Para emergencias, llame al 911 o vaya a emergencias.

Esta hoja es una guía general. Siga las instrucciones específicas de su cirujano, equipo quirúrgico o enfermera de alta.