


Stent ureteral urgente por un cálculo renal

Drenaje hoy - tratamiento del cálculo después

Houston Methodist Baytown Urology Associates · 4201 Garth Road, Suite 307, Baytown, TX 77521 · 832.556.6046

¿Preguntas o inquietudes? Envíenos un mensaje por MyChart. MyChart es la mejor manera de comunicarse con nuestro equipo para preguntas y fotos no urgentes. Llame a la clínica al 832.556.6046 para preguntas urgentes. Para inquietudes urgentes fuera del horario, siga las instrucciones de guardia en sus documentos de alta.

En la sala de emergencias o el hospital, el primer paso más seguro puede ser colocar un stent ureteral para drenar el riñón. El cálculo generalmente no se extrae durante este procedimiento urgente. Esto no es ignorar el cálculo - es tratar primero el bloqueo urgente para que el procedimiento completo del cálculo pueda hacerse de forma más segura después. Un stent ureteral es un tubo temporal blando del riñón a la vejiga.



Dr. _____ · Próximo paso planeado: _____

Por qué un stent primero - y por qué no extraer el cálculo hoy

¿Por qué un stent primero?

Un cálculo puede bloquear que la orina drene del riñón. El drenaje alivia la presión y protege la función renal.

Si hay infección, el drenaje ayuda a que los antibióticos funcionen.

El drenaje puede estabilizar el dolor, los vómitos, la hinchazón del riñón o la inflamación.

¿Por qué no extraer el cálculo hoy?

La colocación urgente del stent es un procedimiento rápido de drenaje. El tratamiento completo del cálculo es una cirugía planeada que a menudo necesita un montaje completo para cálculos, equipo láser/succión especializado, insumos desechables y el equipo de quirófano correcto.

Para cálculos grandes, densos, infectados o inflamados, planificar la cirugía del cálculo suele ser más seguro que tratar de hacer todo de noche o un fin de semana.

Plan típico

1) Colocar el stent para drenar el riñón. 2) Tratar la infección, el dolor, los vómitos o la hinchazón. 3) Dejar que el uréter y el riñón se calmen. 4) Programar la ureteroscopía/láser para tratar el cálculo después.

Recordatorios importantes

El stent no extrae el cálculo. No retire un stent a menos que su equipo de urología se lo indique.

La oficina puede organizar una conversación por MyChart, revisión de imágenes o una visita de seguimiento para finalizar la cirugía.

Sepa qué esperar y cuándo actuar

LOS SÍNTOMAS DEL STENT SON COMUNES	LLAME A LA CLÍNICA / MYCHART	ATENCIÓN URGENTE / SALA DE EMERGENCIAS
<ul style="list-style-type: none">• Urgencia o necesidad de orinar a menudo• Ardor al orinar• Presión o espasmos en la vejiga• Sangre en la orina que va y viene• Dolor en el costado/riñón, especialmente durante o justo después de orinar	<ul style="list-style-type: none">• Síntomas del stent difíciles de tolerar pero está estable y aún orina• Preguntas sobre sus medicinas, el stent o programar la cirugía del cálculo• Síntomas que empeoran en lugar de mejorar	<ul style="list-style-type: none">• Fiebre de 100.4°F / 38°C o más, o escalofríos temblorosos• Dolor intenso no controlado con medicina• Vómitos persistentes o incapacidad para retener líquidos• No puede orinar• Desmayo, debilidad o sensación de mucho malestar

Un stent puede ser incómodo, pero está haciendo un trabajo importante: mantener el riñón drenando mientras nos preparamos para tratar el cálculo. Los síntomas suelen mejorar después del retiro.